

PROSPEKTÜS

SABALAKS LAVMAN

FORMÜLÜ :

Her bir körüklü plastik şişe (30 g) ; 14.400 g Sorbitol, 10.500 g Gliserin, 2.700 g Trisodyum sitrat dihidrat,

Yardımcı maddeler: 216 mg Sodyum lauril sülfasetat ve 24 mg Sorbik asit içermektedir.

Her bir tüp (10 g); 4.800 g Sorbitol, 3.500 g Gliserin, 0.900 g Trisodyum sitrat dihidrat

Yardımcı maddeler: 72 mg Sodyum lauril sülfasetat ve 8 mg Sorbik asit içermektedir.

Her tüp (10 g) içinde: Sorbitol 4.800 g. gliserin 3.500 g. tri sodyum sitrat dihidrat 0.900 g. ve sodyum lauril sülfasetat, sorbik asit içerir.

Her bir körüklü plastik şişe (30g) ; Sorbitol 14.400 g, gliserin 10.500 g. trisodyum sitrat dihidrat 2.700 g. sodyum lauril sülfasetat ve sorbik asid, içerir.

ÖZELLİKLERİ :

SABALAKS rektum ve sigmoid kolonu peptonizasyon yolu ile boşaltan bir lavmandır. SABALAKS'in etken maddelerinden Sorbitol ve Gliserin hiperosmotik maddeler olup hemen hemen hiç emilmeden lokal etkileri ile rektum içeriğini parçalayıp dışkılamayı sağlarlar. Etkisini sadece feçes üzerinedir. Defekasyon refleksine direkt olarak etki yapmaz. SABALAKS elektrolit dengesizliğine yol açmaz, barsak cidarını tahriş etmez.

ENDİKASYONLARI :

- Kolon ve rektal atoniler
- Gebelik kabızlıkları
- Rektoskopi ve cerrahi müdahale öncesi barsak boşaltma ve hazırlanması
- Kabızlığın sorun teşkil ettiği miyokard enfarktüsü, serebral abseler, hipertansiyon gibi durumlar
- Çocuk kabızlıkları

KONTRENDİKASYONLAR :

Kanayan hemaroidlerde, fistül, ülseratif kolit, anorektal cerrahi müdahale sonrası kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :

SABALAKS'in lokal ve sistemik yan etkisi yoktur.

BEKLENİLMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ :

Genel olarak büyüklere duruma göre körüklü plastik şişe (30g) veya bir tüp (10 g) çocuklara ise ½ tüp yeterlidir. Gerektiğinde doktor önerisi ile bu dozun iki katı uygulanabilir.

Uygulama için kutu içindeki kanül tüpe takılır ve kanül tüp içindeki ilaçla ıslatılarak rektuma dikkatle sokulur. Tüp sonuna kadar sıkılarak ilacın tamamının rektuma girmesi sağlanır.

Doğum, rektoskopi ve cerrahi müdahale öncesi barsak boşaltma ve hazırlanması ve ileri derecedeki konstipasyon durumlarında; 30 g'lık körüklü plastik şişenin ucundaki kanül rektuma sokulur. Körüklü şişenin alt kısmından bastırılarak ilacın tamamının rektuma girmesi sağlanır.

SAKLAMA KOŞULLARI :

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJI :

10 g'lık alüminyum tüplerde özel kanülü ile birlikte ; 1 ve 5'lik kutularda.

30 g'lık körüklü plastik şişede özel kanülü ile birlikte.

RUHSAT NUMARASI : 22.08.1994-170/37

RUHSAT SAHİBİ : Saba İlaç San. ve Tic. A. Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

34303 No:1 Kat:1 Küçükçekmece/İSTANBUL

İMAL YERİ: Münir Şahin İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Kartal/İSTANBUL

Reçete ile satılır.